

The FMC logo is displayed in red text on a white rectangular background in the upper right corner of the image. The background of the entire page is a close-up photograph of green wheat stalks.

FMC

Foxtrot® 069 EW

Ochrona przed chwastami

Miotłę wymiata

WIOSENNA LIKWIDACJA CHWASTÓW JEDNOLIŚCIENNYCH W UPRAWACH ZBÓŻ, NAWET W ICH PÓŹNIEJSZYCH FAZACH ROZWOJOWYCH.

- Szybkie hamowanie wzrostu chwastów
- Bezpieczeństwo rośliny uprawnej
- Elastyczny zakres terminów stosowania i dawek

Foxtrot® 069 EW jest środkiem działającym systemicznie, pobieranym przez zielone części roślin, a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, tj. do stożków wzrostu pędów i korzeni.

- **1–3 dni po zabiegu wzrost chwastów ulega zahamowaniu.**
- **7–14 dni po zabiegu pojawiają się przebarwienia liści.**
- **10–20 dni po zabiegu chlorozy zamieniają się w nekrozy.**
- **Następuje dalsze zamieranie tkanek.**
- **W zależności od warunków pogodowych, pełne zniszczenie rośliny trwa 10–30 dni.**

POSIADA REJESTRACJĘ DO ZWALCZANIA:

- **miotły zbożowej**
- **owsa głuchego**
- **chwastnicy jednostronnej**

Foxtrot® jest znakiem towarowym FMC Corporation i podmiotów stowarzyszonych.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA:

| Gatunki zbóż | |
|--|---|
| Pszenica ozima, pszenżyto ozime | Jęczmień jary, pszenica jara |
| Termin stosowania | |
| Wiosną po ruszeniu wegetacji do końca fazy krzewienia | W fazie krzewienia, najpóźniej do początku fazy strzelania w źdźbło |
| Dawki stosowania | |
| 1,0–1,2 l/ha | 0,8–1,0 l/ha |
| Stosując łącznie z adiuwantem w dawce: | |
| Foxtrot® 069 EW 0,5 l/ha + Atpolan 80 EC 1,0 l/ha | |
| Łączne stosowanie z produktem na chwasty dwuliścienne: | |
| Foxtrot® 069 EW 1,0–1,2 l/ha + Nuance 75 WG 20 g/ha | |

- Niższe dawki produktu można stosować przy zabiegach solo i przy wsparciu adiuwanta
- Przy łącznym stosowaniu produktu z innym herbicydem, warto stosować wyższe dawki.
- Wyższą dawkę stosować do zwalczania chwastów znajdujących się w późniejszej fazie rozwojowej oraz w warunkach niesprzyjających wegetacji (np. w niskiej temperaturze, podczas suszy).
- Niższą dawkę stosować do zwalczania chwastów we wcześniejszych fazach rozwojowych (przed rozpoczęciem fazy krzewienia).

ZE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NALEŻY KORZYSTAĆ Z ZACHOWANIEM BEZPIECZEŃSTWA. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM PRZECZYTAJ INFORMACJE ZAMIESZCZONE W ETYKIECIE I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU. ZWRÓĆ UWAGĘ NA ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ PRZESTRZEGAJ ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA ZAMIESZCZONYCH W ETYKIECIE.

Nasi przedstawiciele

- 1. Katarzyna Pośpiech 882 434 314**
katarzyna.pospiech@fmc.com
- 2. Dominika Lisowska 784 585 238**
dominika.lisowska@fmc.com
- 3. Katarzyna Stasilewicz 538 810 697**
katarzyna.stasilewicz@fmc.com
- 4. Jakub Bednarczyk 604 752 458**
jakub.bednarczyk@fmc.com
- 5. Marek Jackowski 538 810 703**
marek.jackowski@fmc.com
- 6. Adam Chrzanowski 604 118 582**
adam.chrzanowski@fmc.com
- 7. Marek Dąbrowski 604 403 905**
marek.dabrowski@fmc.com
- 8. Przemysław Brzozowski 538 810 689**
przemyslaw.brzozowski@fmc.com
- 9. Jacek Jagielski 664 179 000**
jacek.jagielski@fmc.com
- 10. Mateusz Markowski 692 173 590**
mateusz.markowski@fmc.com
- 11. Grzegorz Chmielniak 660 618 732**
grzegorz.chmielniak@fmc.com
- 12. Krzysztof Witkowski 735 207 213**
krzysztof.witkowski@fmc.com
- 13. Leszek Konior 532 510 444**
leszek.konior@fmc.com



FMC Agro Polska Sp. z o.o.

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

tel. +48 22 397 17 86, www.fmcagro.pl