

The FMC logo is displayed in red, bold, sans-serif capital letters. It is positioned in the upper right corner of the image, which features a background of a soil cross-section with various layers of soil and green plants. The logo is set against a white rectangular background.

**FMC**

# **Stallion® 363 CS**

Ochrona przed chwastami

**Daje pole do popisu**

# PRZEDWSCHODOWY HERBICYD DO OCHRONY GROCHU, BOBIKU, ZIEMNIAKÓW, MARCHWI I SELERA KORZENIOWEGO PRZED CHWASTAMI JEDNO- I DWULIŚCIENNYMI

- Wysoka skuteczność dzięki dwóm sprawdzonym substancjom czynnym
- Zapobieganie powstawaniu odporności
- Opatentowana technologia SYNCTEC®
- Pierwsze łączne kapsułkowanie
- Mniej zanieczyszczeń w opryskiwaczu i opakowaniach

## STALLION® 363 CS ZAWIERA DWIE SUBSTANCJE CZYNNIE O UZUPEŁNIAJĄCYM SIĘ MECHANIZMIE DZIAŁANIA.

- Chlomezon jest absorbowany przez korzenie i część podziemną roślin, hamuje w roślinach syntezę barwników (chlorofilu i karotenoidów).
  - Pendimetalina jest pobierana przez korzenie i części nadziemne, hamuje procesy podziału komórek i wzrostu roślin.
- Łączne kapsułkowanie obu składników w opatentowanej technologii SYNCTEC®, zapewnia ich optymalne uwalnianie do gleby. Rośliny wrażliwe bieleją i zamierają. Środek niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy pierwszych liści.

## CHWASTY WRAŻLIWE:

chwastnica jednostronna,  
dymnica pospolita,  
fiołek polny,  
gwiazdnica pospolita,  
jasnota purpurowa,  
jasnota różowa,

komosa biała,  
niezapominajka polna,  
perz właściwy,  
psianka czarna,  
przetacznik bluszczokowy,  
pokrzywa żegawka,

przytulia czepna,  
rdest powojowy (rdestówka powojowata),  
rdest ptasi,  
rumianek pospolity,  
szarłat szorstki,  
tasznik pospolity, tobołki polne,  
wiechlina roczna.

## ZALECENIA STOSOWANIA:

### Roślina uprawna:

ziemniak

### Termin stosowania:

Wykonać po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola, przed wejściem ziemniaków – najpóźniej na 7 dni przed ukazaniem się pierwszych wschodów roślin ziemniaka. Nie wykonywać zabiegu po wschodach lub na liście.

### Roślina uprawna:

groch jadalny, bobik

### Termin stosowania:

Groch wysiewać na głębokość co najmniej 25 mm, w odleżałą glebę. Środek stosować bezpośrednio po siewie, na wilgotną, starannie uprawioną glebę bez grud i nierówności. Nie stosować, gdy kiełek znajduje się bliżej niż 13 mm od powierzchni. Nie stosować, gdy gleba jest przesuszona.

# ZALECENIA STOSOWANIA:

## Roślina uprawna:

**marchew, seler korzeniowy\***

## Termin stosowania:

Bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na starannie uprawioną glebę bez grud i nierówności.

## Zalecana dawka:

**3,0 l/ha**

\*rejestracja w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Stallion® jest znakiem towarowym FMC Corporation i podmiotów stowarzyszonych.

**ZE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NALEŻY KORZYSTAĆ Z ZACHOWANIEM BEZPIECZEŃSTWA. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM PRZECZYTAJ INFORMACJE ZAMIESZCZONE W ETYKIECIE I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU. ZWRÓĆ UWAGĘ NA ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ PRZESTRZEGAJ ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA ZAMIESZCZONYCH W ETYKIECIE.**

## Nasi przedstawiciele

- 1. Katarzyna Pośpiech 882 434 314**  
katarzyna.pospiech@fmc.com
- 2. Dominika Lisowska 784 585 238**  
dominika.lisowska@fmc.com
- 3. Katarzyna Stasilewicz 538 810 697**  
katarzyna.stasilewicz@fmc.com
- 4. Jakub Bednarczyk 604 752 458**  
jakub.bednarczyk@fmc.com
- 5. Marek Jackowski 538 810 703**  
marek.jackowski@fmc.com
- 6. Adam Chrzanowski 604 118 582**  
adam.chrzanowski@fmc.com
- 7. Marek Dąbrowski 604 403 905**  
marek.dabrowski@fmc.com
- 8. Przemysław Brzozowski 538 810 689**  
przemyslaw.brzozowski@fmc.com
- 9. Jacek Jagielski 664 179 000**  
jacek.jagielski@fmc.com
- 10. Mateusz Markowski 692 173 590**  
mateusz.markowski@fmc.com
- 11. Grzegorz Chmielniak 660 618 732**  
grzegorz.chmielniak@fmc.com
- 12. Krzysztof Witkowski 735 207 213**  
krzysztof.witkowski@fmc.com
- 13. Leszek Konior 532 510 444**  
leszek.konior@fmc.com



**FMC Agro Polska Sp. z o.o.**

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

tel. +48 22 397 17 86, [www.fmcagro.pl](http://www.fmcagro.pl)