



FMC

Twój sposób na stonkę ziemniaczaną

Coragen[®] 200 SC

Ochrona przed szkodnikami

powered by

RYNAXYPYR[®]

active ingredient

1 ha =
OPAKOWANIE
50 ml

Dowiedz się więcej: www.stonkaziemniaczana.com

DLACZEGO CORAGEN® 200 SC

- Ograniczenia neonicotynoidów: tiametksam poza rynkiem
- Słabe działanie pyretroidów (wysokie temperatury, uodpornienia)
- Wysoka i długa skuteczność już od 50 ml/ha
- Czas skuteczności środka Coragen® do 3 tygodni
- Działanie na wykluwające się larwy (po zjedzeniu otoczki jaj opryskanych)
- Skuteczny w wyższych temperaturach (w porównaniu do pyretroidów)
- Bezpieczny dla środowiska i owadów pożytecznych



CORAGEN® 200 SC

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

- Uprawa: **ziemniak**
- Szkodnik: **stonka ziemniaczana**
(*Leptinotarsa decemlineata*)
- Dawka substancji: **10-12 g/ha**
- Dawka produktu: **50-62,5 ml/ha**
- Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: **2**
- Odstęp pomiędzy zabiegami min.: **10 dni**
- Karencja: **14 dni**
- Ilość wody: **150-400 l/ha**



KIEDY STOSOWAĆ NA STONKĘ ZIEMNIACZANĄ?

Biologia szkodnika: w Europie występuje 1-3 pokoleń w roku

Aplikacja ma głównie zwalczyć pierwsze pokolenie (produkt działa nawet do 3 tygodni)

CORAGEN® 50-62,5 ml/ha



Optymalny czas aplikacji: wystąpienie osobników dorosłych i jaj przed wykluwaniem

Unikać późnego stosowania, gdy są już widoczne uszkodzenia

W przypadku kolejnych nalotów, zabieg można powtórzyć po 14-21 dniach od pierwszej aplikacji.


CORAGEN® – DOSKONAŁA OCHRONA UPRAW ZIEMNIAKA PRZED STONKĄ ZIEMNIACZANĄ



Produkt był sprawdzany w wielu krajach, często przy bardzo dużej presji szkodnika.

CORAGEN® 200 SC W ZWALCZANIU STONKI W UPRAWIE ZIEMNIAKA

Skuteczność różnych dawek środka Coragen® w zwalczaniu larw stonki ziemniaczanej % skuteczności 3 dni po zabiegu



Coragen® 200 SC **50 ml**

Coragen® 200 SC **62,5 ml**

tiametoksam **80 g**

BADANIA REJESTRACYJNE, DŁUGOŚĆ DZIAŁANIA

Obiekt doświadczalny Bonin 2006	Dawki na 1 ha	Skuteczność wg Hendersona-Tiltona [%]											
		dni po zabiegu											
		3			7			14			21		
		L1-L2	L3-L4	L1-L4	L1-L2	L3-L4	L1-L4	L1-L2	L3-L4	L1-L4	L1-L2	L3-L4	L1-L4
Coragen® 200 SC	50 ml	100	100	100	100	96,5	98,1	100	100	100	100	100	100
Coragen® 200 SC	62,5 ml	100	100	100	100	94,8	98,0	100	100	100	100	100	100
tiametoksam (aktualnie substancja wycofana z UE)	80 g	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Coragen® i Rynaxypyr® są znakami towarowymi FMC Corporation i podmiotów stowarzyszonych.

ZE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NALEŻY KORZYSTAĆ Z ZACHOWANIEM BEZPIECZEŃSTWA. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM PRZECZYTAJ INFORMACJE ZAMIESZCZONE W ETYKIECIE I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU. ZWRÓĆ UWAGĘ NA ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ PRZESTRZEGAJ ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA ZAMIESZCZONYCH W ETYKIECIE.

Nasi przedstawiciele

Zachód

Jakub Bednarczyk – Kierownik regionu

604 752 458 jakub.bednarczyk@fmc.com

Dominika Lisowska 784 585 238

dominika.lisowska@fmc.com

Katarzyna Pośpiech 882 434 314

katarzyna.pospiech@fmc.com

Katarzyna Stasilewicz 538 810 697

katarzyna.stasilewicz@fmc.com

Południe

Adam Chrzanowski – Kierownik regionu

604 118 582 adam.chrzanowski@fmc.com

Radosław Bończak 538 810 689

radoslaw.bonczak@fmc.com

Grzegorz Chmielniak 660 618 732

grzegorz.chmielniak@fmc.com

Mateusz Markowski 692 173 590

mateusz.markowski@fmc.com

Wschód

Krzysztof Witkowski – Kierownik regionu

735 207 213 krzysztof.witkowski@fmc.com

Marek Jackowski 538 810 703

marek.jackowski@fmc.com

Leszek Konior 532 510 444

leszek.konior@fmc.com



FMC Agro Polska Sp. z o.o.

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

tel. +48 22 397 17 86, www.fmcagro.pl