

The FMC logo is displayed in red, bold, sans-serif capital letters. The letter 'F' is stylized with a horizontal bar that extends to the left, ending in a small vertical tick mark. The background of the entire image is a close-up photograph of green wheat spikes, with some in sharp focus and others blurred in the background.

FMC

Foxtrot[®] 069 EW

Ochrona przed chwastami

Miotłę wymiata

WIOSENNA LIKWIDACJA CHWASTÓW JEDNOLIŚCIENNYCH W UPRAWACH ZBÓŻ, NAWET W ICH PÓŹNIEJSZYCH FAZACH ROZWOJOWYCH.

- Szybkie hamowanie wzrostu chwastów
- Bezpieczeństwo rośliny uprawnej
- Elastyczny zakres terminów stosowania i dawek

Foxtrot® 069 EW jest środkiem działającym systemicznie, pobieranym przez zielone części roślin, a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, tj. do stożków wzrostu pędów i korzeni.

- 1–3 dni po zabiegu wzrost chwastów ulega zahamowaniu.
- 7–14 dni po zabiegu pojawiają się przebarwienia liści.
- 10–20 dni po zabiegu chlorozy zamieniają się w nekrozy.
- Następuje dalsze zamieranie tkanek.
- W zależności od warunków pogodowych, pełne zniszczenie rośliny trwa 10–30 dni.

POSIADA REJESTRACJĘ DO ZWALCZANIA:

- miotły zbożowej
- owsa głuchego
- chwastnicy jednostronnej

Foxtrot® jest znakiem towarowym FMC Corporation i podmiotów stowarzyszonych.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA:

Gatunki zbóż	
Pszenica ozima, pszenżyto ozime	Jęczmień jary, pszenica jara
Termin stosowania	
Wiosną po ruszeniu wegetacji do końca fazy krzewienia	W fazie krzewienia, najpóźniej do początku fazy strzelania w źdźbło
Dawki stosowania	
1,0–1,2 l/ha	0,8–1,0 l/ha
Stosując łącznie z adiuwantem w dawce:	
Foxtrot® 069 EW 0,5 l/ha + Atpolan 80 EC 1,0 l/ha	
Łączne stosowanie z produktem na chwasty dwuliścienne:	
Foxtrot® 069 EW 1,0–1,2 l/ha + Nuance 75 WG 20 g/ha	

- Niższe dawki produktu można stosować przy zabiegach solo i przy wsparciu adiuwanta
- Przy łącznym stosowaniu produktu z innym herbicydem, warto stosować wyższe dawki.
- Wyższą dawkę stosować do zwalczania chwastów znajdujących się w późniejszej fazie rozwojowej oraz w warunkach niesprzyjających wegetacji (np. w niskiej temperaturze, podczas suszy).
- Niższą dawkę stosować do zwalczania chwastów we wcześniejszych fazach rozwojowych (przed rozpoczęciem fazy krzewienia).

ZE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NALEŻY KORZYSTAĆ Z ZACHOWANIEM BEZPIECZEŃSTWA. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM PRZECZYTAJ INFORMACJE ZAMIESZCZONE W ETYKIECIE I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU. ZWRÓĆ UWAGĘ NA ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ PRZESTRZEGAJ ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA ZAMIESZCZONYCH W ETYKIECIE.

Nasi przedstawiciele

Zachód

Jakub Bednarczyk – Kierownik regionu

604 752 458 jakub.bednarczyk@fmc.com

Dominika Lisowska 784 585 238

dominika.lisowska@fmc.com

Katarzyna Pośpiech 882 434 314

katarzyna.pospiech@fmc.com

Katarzyna Stasilewicz 538 810 697

katarzyna.stasilewicz@fmc.com

Południe

Adam Chrzanowski – Kierownik regionu

604 118 582 adam.chrzanowski@fmc.com

Radosław Bończak 538 810 689

radoslaw.bonczak@fmc.com

Grzegorz Chmielniak 660 618 732

grzegorz.chmielniak@fmc.com

Mateusz Markowski 692 173 590

mateusz.markowski@fmc.com

Wschód

Krzysztof Witkowski – Kierownik regionu

735 207 213 krzysztof.witkowski@fmc.com

Marek Jackowski 538 810 703

marek.jackowski@fmc.com

Leszek Konior 532 510 444

leszek.konior@fmc.com



FMC Agro Polska Sp. z o.o.

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

tel. +48 22 397 17 86, www.fmcagro.pl